

POBIERANIE MOCZU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Uwaga! Mocz do badania ogólnego i na posiew zawsze należy dostarczać w dwóch oddzielnych pojemnikach: niejążowym i jażowym (lub w dwóch jażowych).

- Mocz na posiew należy pobrać rano, najlepiej po minimum 4 godzinach od ostatniej mikcji .
- Mocz należy pobrać przed włączeniem antybiotykoterapii.
- W przypadku trwania terapii należy poinformować personel laboratorium o rodzaju przyjmowanego leku.
- Mocz na posiew należy pobrać do jednorazowego, jażowego pojemnika zakupionego w aptece.
- Przed pobraniem należy umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
- Przed pobraniem należy dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, następnie osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
- Bezpośrednio przed samym pobraniem otworzyć ostrożnie jażowy pojemnik, nie dotykając jego wewnętrznych powierzchni.
- Mocz należy pobrać ze środkowego strumienia - pierwszą partię moczu należy oddać do toalety, drugą partię moczu, nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika, maksymalnie do 1/3 jego wysokości.
- Aby nie doszło do przypadkowego zanieczyszczenia próbki, nie można dotykać brzegiem pojemnika okolic narządów płciowych, a także palcami wewnętrznej powierzchni jażowego pojemnika.
- Pojemnik natychmiast zamknąć. Opisać imieniem i nazwiskiem.
- Natychmiast po pobraniu pojemnik z moczem należy dostarczyć do punktu pobrań lub do laboratorium.
- Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie moczu do laboratorium, próbkę należy przechowywać w temp. 4-8 °C.